

Zarządzenie Nr 107/2022
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 10 października 2022 r.

**w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu
na wypadek zdarzenia radiacyjnego
na terenie gminy Zawonia**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022, poz. 559 ze zm.), art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa sposób przechowywania, transportu i dystrybucji preparatu jodowego na terenie gminy Zawonia w sytuacji wystąpienia realnego zdarzenia radiacyjnego.

§ 2. W celu właściwego przygotowania do podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia promieniowania jonizującego, mającego na celu podanie ludności przebywającej na terenie gminy Zawonia preparatów jodowych organizuje się i przygotowuje punkty przechowywania i dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu w czterech punktach:

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Zawoni ul. Spacerowa 6, 55-106 Zawonia w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni;
2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie ul. Topolowa 1, 55-106 Czeszów w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni;
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni ul. Szkolna 26, 55-106 Zawonia -(hala sportowa);
4. Szkoła Podstawowa w Czeszowie ul. M. Konopnickiej 18, 55-106 Czeszów- (hala sportowa).

§ 3. Uruchomienie działań związanych ze zdarzeniem radiacyjnym nastąpi na podstawie rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia działań interwencyjnych na obszarze województwa dolnośląskiego.

§ 4. W sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego uruchamia się „Plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Zawonia ”stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Za organizację działań związanych z wydawaniem tabletek jodowych oraz aktualizowanie co najmniej raz w roku danych dotyczących liczby ludności gminy Zawonia z podziałem na grupy ryzyka odpowiedzialnym jest referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zawonia

Agnieszka Wersta

URZĄD GMINY W ZAWONI

ZATWIERDZAM

.....
SOW. 5535.1.2022



PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATU JODOWEGO W PRZYPADKU ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA TERENIE GMINY ZAWONIA

Wykonała:
Monika Hetman

Zawonia – 2022r. SPIS TREŚCI:

1	Arkusze aktualizacji	3 strona
2	Podstawy prawne	4 strona
3	Uruchomienie działań interwencyjnych	4 strona
4	Postanowienia ogólne - środki transportu do przewozu preparatów jodowych	4 strona 5 strona
5	Miejsce i warunki przechowywania preparatu stabilnego jodu	5 strona
6	Organizacja wydawania preparatu jodowego a) grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach b) zapotrzebowanie na preparat jodowy dla mieszkańców gminy należących do grup ryzyka c) Punkty wydawania preparatu jodowego i osoby odpowiedzialne	6 strona 6 strona 7 strona 8 strona
7	Procedura podejmowania działań w celu uruchomienia dystrybucji tabletek jodowych na terenie gminy Cieszków	9 strona
8	Zasady wydawania preparatów jodowych w punktach dystrybucji	10 strona
9	Instrukcja rozwinięcia i działania punktu wydawania tabletek jodku potasu	10 strona
10	Protokół wydania/przyjęcia preparatu jodowego	12 strona
11	Broszura informacyjna- Profilaktyka jodowa	13 strona

1. Arkusz aktualizacji

Lp.	Data aktualizacji	Opis zmiany	Podpis
1	2	3	5

2. Podstawy prawne

1. Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1941).
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 135).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96 poz. 850).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1086).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych (Dz. U. z 2002 r. nr 239 poz. 2030).
7. Rekomendacje Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z dnia 2 marca 2022 r. (znak DBD.531.10.31.2021.3)

3. Uruchomienie działań interwencyjnych

Decyzję o rozpoczęciu wydawania preparatu stabilnego jodu podejmuje wojewoda (w przypadku zdarzenia radiacyjnego, którego zasięg skutków nie przekracza obszaru województwa) lub Prezes Rady Ministrów (w przypadku zdarzenia, którego zasięg skutków przekracza obszar jednego województwa). Wprowadzenie działań interwencyjnych nastąpi w drodze aktu prawa miejscowego wojewody lub rozporządzenia Rady Ministrów, o czym informacja zostanie niezwłocznie przekazana poprzez WCZK do PCZK/MCZK (dalej z PZCK do GCZK), informacja z WCZK będzie zawierała datę godzinę rozpoczęcia przyjmowania preparatu na wskazanym obszarze.

4. Postanowienia ogólne

W przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego powodującego przekroczenie poziomu interwencyjnego dla izotopów radioaktywnych w powietrzu, dla potrzeb profilaktycznego zabezpieczenia zdrowia zagrożonej ludności, **będzie wydawany preparat jodowy w postaci tabletek jodku potasu.**

Podanie mieszkańcom radiologicznie stabilnego jodu spowoduje wysycenie tarczycy tym lekiem i zapobiegnie wychwytowi szkodliwego dla człowieka promieniotwórczego jodu (radionuklidów) uwolnionego do środowiska w wyniku poważnego zdarzenia radiacyjnego.

Za realizację zadań w zakresie wydania dla ludności preparatu jodowego na terenie gminy Zawonia odpowiada Wójt Gminy Zawonia.

Środki transportu do przewozu preparatów jodowych

Lp.	Nazwa dysponenta samochodu	Ilość
1	Waldemar Kępski	1 samochód prywatny
2	Jacek Prażuch	1 samochód prywatny

Plan ma na celu sprawną i niezwłoczną dystrybucję tabletek jodku potasu na terenie gminy Zawonia na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Głównym założeniem planu jest wydanie tabletek jodku potasu mieszkańcom gminy w określonych grupach ryzyka w ciągu 24 godzin od podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji dystrybucji tabletek jodowych w związku z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego.

5. Miejsce i warunki przechowywania preparatu stabilnego jodu

**Miejscem przechowywania tabletek stabilnego jodu jest:
Urząd Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia**

Warunki do spełnienia:

- pomieszczenie, w którym jest przechowywany produkt leczniczy nie może być narażone na zawilgocenie oraz bezpośrednio nasłonecznienie;
- temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 25°C;
- produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią, z dala od źródeł ciepła, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla osób postronnych i dzieci;
- miejsca przechowywania mogą być jednocześnie punktami dystrybucji preparatu dla ludności;

Akcją jodową na terenie gminy kieruje Wójt i odpowiada za :

- * rozwinięcie Gminnego Punktu Dystrybucji;
- * transport preparatu jodowego z Gminnego Punktu Dystrybucji do Punktów Wydawania preparatu jodowego;
- * ustalenie liczby ludności na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka;

- * zapewnienie właściwej realizacji zadań związanych z wydawaniem preparatu jodowego dla mieszkańców gminy Zawonia;
- * nadzorowanie sprawnego przebiegu akcji na terenie gminy Zawonia;
- * aktualizowanie, co najmniej raz w roku, danych dotyczących liczby ludności na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka;
- * powiadomienie jednostek wyznaczonych do wydawania preparatów ze stabilnym jodem;
- * powiadomienie ludności o podjętych działaniach.

6. Organizacja wydawania preparatu jodowego

Tabletki należy przyjąć jednorazowo, jak najszybciej po ogłoszeniu komunikatu (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin po wystąpieniu na działanie radioaktywnym jodem jest pomocne i korzystne.

Przyjmowanie zgodnie z ulotką.

Osoby nieletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny.

Punkty dystrybucji mogą realizować:

- wyłącznie wydawanie tabletek jodku potasu:

- * dla osób pełnoletnich należących do grup uprawnionych do otrzymania leku,
- * dla rodziców/opiekunów w celu podania leku osobom nieletnim.

a) Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach:

Lp.	Grupa ryzyka	Ilość jodu stabilnego	Ilość jodku potasu w pojedynczej dawce	Stosowanie tabletek jodku potasu
1.	Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	12,5 mg	1/4 tabletki = 12,5 mg jodu)	¼ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi
2.	Dzieci od miesiąca do 3 lat	25 mg	1/2 tabletki = 25 mg jodu)	½ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku

3.	Dzieci od 3 do 12 lat	50 mg	(1 tabletką = 50 mg jodu)	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju
4.	Dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 lat	100 mg	2 tabletki = 100 mg jodu)	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem
5.	Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)	100 mg	2 tabletki = 100 mg jodu)	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem

W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/ opiekunów dzieci do lat trzech (dla których przewidziano przyjęcie $\frac{1}{4}$ lub $\frac{1}{2}$ tabletki), należy wydać całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/ opiekunowie.

W przypadku gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla dwojga dzieci.

Zabezpieczenie w preparat dotyczy wszystkich osób do 60 roku życia oraz wszystkich zaangażowanych w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu – bez limitu wiekowego.

b) Zapotrzebowanie na preparat jodowy dla mieszkańców gminy Zawonia należących do grup ryzyka

Lp.	Grupa ryzyka	Dawka	Liczba osób (stan w dniu 04.10.2022 r.)	Konieczna ilość tabletek/ ilość blistrów
1	2	3	4	5
1	Dzieci powyżej 12 lat do 60 roku życia dorośli	2 tabletki	3788	7576/758
2	Dzieci od 3 do 12 lat	1 tabletką	638	638/64
3	Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat	$\frac{1}{2}$ tabletki	147	147/15
4	Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	$\frac{1}{4}$ tabletki	3	3/1
Razem :			4576	8364/837

c) Punkty wydawania preparatu jodowego i osoby odpowiedzialne

Na terenie gminy Zawonia będą funkcjonowały 4 punkty wydawania tabletek jodowych.

Na terenie gminy Zawonia osoby kierujące akcją jodową:

1. Monika Hetman

Lp.	Punkt wydawania preparatu jodowego	Dyrektor/ Kierownik	Tel. służbowy	Osoba odpowiedzial na za punkt	Telefon	Ilość wydanych pudełek ze stabilnym jodem
1	Punkt 1 Gminny Ośrodek Zdrowia w Zawoni ul. Spacerowa 6, 55-106 Zawonia w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni	Małgorzata Wieczorek- Zdziarska	71 312 81 68 71 312 71 29			
2	Punkt 2 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie ul. Topolowa 1 55-106 Czeszów w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni	Małgorzata Wieczorek- Zdziarska	71 312 81 29			
3	Punkt 3 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zawoni ul. Szkolna 26 55-106 Zawonia (hala sportowa)	Agnieszka Andruszczak	71 312 71 93			
4	Punkt 4 Szkoła Podstawowa w Czeszowie ul. M. Konopnickiej 18 55-106 Czeszów (hala sportowa)	Elżbieta Kędra	71 312 71 93			

7. Procedura podejmowania działań w celu uruchomienia dystrybucji tabletek jodowych na terenie gminy Zawonia

Zadanie	Czynności do wykonania
Przyjęcie telefonicznej informacji z PCZK o uruchomieniu akcji jodowej na terenie miasta	Zapisanie danych osoby przekazującej informację , wraz z numerem telefonu, z którego dzwoni.
Potwierdzenie telefoniczne otrzymania z PCZK informacji o uruchomieniu akcji jodowej	Zwrotne potwierdzenie otrzymanej informacji - natychmiast
Powiadomienie Wójta o uruchomieniu akcji jodowej	Wójt Gminy – Agnieszka Wersta Sekretarz Wojciech Hoffman
Powiadomienie osób odpowiedzialnych za uruchomienie akcji jodowej	Monika Hetman Referent ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Poinformowanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie punktów wydawania tabletek jodowych	
Dostarczenie tabletek jodowych do punktów dystrybucji	
Poinformowanie mieszkańców gminy Zawonia z poszczególnych grup ryzyka o wydawaniu tabletek jodowych Informowanie ludności o miejscach wydawania preparatów jodowych poprzez: - ulotki, plakaty, strona internetowa urzędu, sms, komunikaty głosowe.	Punkty dystrybucji
Rozpoczęcie pracy wydawania tabletek	
Rozliczenie niewykorzystanych tabletek jodowych	Po zakończonej akcji

8. Zasady wydawania preparatów jodowych w punktach dystrybucji:

1. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie grupom wiekowym wskazanym w tabeli na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej.
2. Wydawanie preparatów jodowych następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
3. Wydawanie preparatu jest jednorazowe.
4. Na obszarze obiektów wydawania preparatów jodowych, nie ma możliwości ich przyjęcia. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
5. Próby pobrania preparatów jodowych, przez osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zgłaszane będą Policji.

9. Instrukcja rozwinięcia i działania punktu wydawania tabletek jodku potasu

1. Na sygnał Wójta lub referenta ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego rozwinąć punkt wydawania tabletek jodku potasu.
2. Przybycie osób odpowiedzialnych za przygotowanie punktu wydawania tabletek jodowych.
3. Przygotowanie punktu do pracy (stół, krzesła, nożyce).
4. Zgłoszenie gotowości do przyjęcia tabletek jodowych.
5. Przyjęcie tabletek jodowych.
6. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie grupom wiekowym wskazanym w tabeli, na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej.
7. Wydawanie preparatów jodowych jest jednorazowe i następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
8. Na obszarze obiektów wydawania preparatów jodowych, nie ma możliwości ich przyjęcia. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
9. Utrzymywanie łączności z osobą kierującą dystrybucją tabletek na szczeblu gminy.

tel. 713104361

10. Próby pobrania preparatów jodowych, przez osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zgłaszane będą Policji.

11. Zakończenie wydawania jodku potasu na sygnał.

Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach:

Lp.	Grupa ryzyka	Ilość jodu stabilnego	Ilość jodku potasu w pojedynczej dawce	Stosowanie tabletek jodku potasu
1.	Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	12,5 mg	1/4 tabletki = 12,5 mg jodu)	¼ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi
2.	Dzieci od miesiąca do 3 lat	25 mg	1/2 tabletki = 25 mg jodu)	½ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku
3.	Dzieci od 3 do 12 lat	50 mg	(1 tabletki = 50 mg jodu)	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju
4.	Dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 lat	100 mg	2 tabletki = 100 mg jodu)	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem
5.	Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)	100 mg	2 tabletki = 100 mg jodu)	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem

W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/ opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie ¼ lub ½ tabletki), należy wydać całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/ opiekunowie.

W przypadku gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla dwojga dzieci.

Zabezpieczenie w preparat dotyczy wszystkich osób do 60 roku życia oraz wszystkich zaangażowanych w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu – bez limitu wiekowego.

.....
(pieczęćka urzędowa)

„wzór”

PROTOKÓŁ WYDANIA / PRZYJĘCIA PREPARATU JODOWEGO

Sporządzony w dniuprzez posiadającego
(data) (nazwisko uprawnionego pracownika)

upoważnienie wystawione przez Wójta Gminy Zawonia Nr
(numer, data wystawienia upoważnienia)

Wydano upoważnionemu odbiorcy
(nazwa punktu wydawania preparatu)

Lp.	Nazwa artykułu	Jednostka miary	Ilość	Uwagi
1.	Tabletka jodku potasu	Blistr (10 tabletek)		

Osoba przekazująca

.....
(imię, nazwisko, podpis)

Osoba przyjmująca

.....
(imię, nazwisko, podpis)

Sporządzono w 2 egz.

Egz. nr 1 – przekazujący Urząd Gminy Zawonia

Egz. nr 2 – przyjmujący

punkt

PROFILAKTYKA JODOWA

BROSZURA INFORMACYJNA



W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasyci tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego (najwcześniej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

- dzieci do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
- dzieci od 3 do 12 r.ż.: 1 tabletkę (50 mg jodu)
- dzieci od 1 miesiąca do 3 r.ż.: 15 tabletek (25 mg jodu)
- noworodki: 1/2 tabletki (12,5 mg jodu)
- kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)



Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem



Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.

Tabletki można rozgryzać lub polykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

- jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli masz nadczynność tarczycy
- jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
- jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa)

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAŻAJ, JEŚLI:

- stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
- występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
- występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
- masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane
- jesteś odwodniony
- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę

PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA

przed przyjęciem leku

→ w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia

→ w przypadku zwięzienia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

po przyjęciu leku

→ z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy



DODATKOWE INFORMACJE



Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu

rejestrmedyczne.ezdrowie.gov.pl



JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ!

